

0-27 Дни | 0-4 Седмици

- Достигнете оптималното живо тегло изравнено.
- Развийте апетита на пилето чрез добра брудинг практика.
- Осигурете достатъчен хранилен и поилен фронт.
- Наблюдавайте напълването на гушата.
- Наблюдавайте поведението на птиците.
- Поддържайте оптимална температура, влажност и вентилация.
- Започнете седмичен мониторинг на живото тегло. Започнете да записвате индивидуалните живи тегла от 14-21 дневна възраст, за да изчислите CV%.
- Където е налична светоизолация, намалете интензитета на светлината до 10-20 лукса (1-2 фут кандели) от 10 дневна възраст.



Бърз растеж на скелета, имунната, храносмилателната & сърдечносъдовата системи.

28-63 Дни | 4-9 Седмици


- Достигнете оптималното живо тегло изравнено.
- Селектирайте на 28 дни.
- Сортирайте в 2 (CV% под 12) или 3 групи (CV% над 12).
- Във всяка селектирана група контролирайте растежа и фуража за досиране на ревизираните цели за живото тегло до 63 дни.
- Спрете прехвърлянето на птици между групите на 63 дни.
- На 63 дни прегледайте живите тегла спрямо целта; преначертайте кривата ако е необходимо.



Период на продължителен растеж и развитие.

64-105 Дни | 9-15 Седмици

- Коригирайте фуражната дажба за достигане оптималното живо тегло изравнено:
- Птиците с по-ниско от оптималното тегло трябва да следват профил, който да ги върне към целта до 105 дни.
- Птиците с по-високо от оптималното тегло трябва да следват профил, който върви успоредно на целевата крива.
- Птиците не трябва да губят живо тегло през този период.



90% от растежа на скелета е завършен на около 80-95 дневна възраст.

106-161 Дни | 15-23 Седмици

- Увеличете фуражните дажби за да стимулирате степента на растежа в съответствие с целите и подгответе птиците за полово зрялост.
- Определяйте разстоянието между тазовите кости ежеседмично за мониторинг на половото развитие.
- Изчислете изравнеността на стадото една седмица преди първото планирано увеличение на светлината:
 - Ако птиците са в целта и изравнени (CV% под 10) светостимулирайте както е препоръчано.
 - Ако птиците са под целта или неизравнени (CV% над 10), забавете стимулацията с най-малко 7 дни.
- Комплектувайте на 147 дни; обезпечете синхронизация на половата зрялост на мъжките и женските.
- Наблюдавайте поведението при хранене за мониторинг на разделно-половото хранене и разпределението на фуража.



Ускорен растеж & теглови прираст за да подготви птиците за полово зрялост и комплектуване.

162-210 Дни | 23-30 Седмици

- Хранете женските за стимулация и поддръжка нарастването на носливостта, яйчното тегло и растежа.
- Преминете към фураж за родители не по-късно от 5 % носливост.
- Хранете мъжките за постигане на растеж и поддръжка на оплодяемостта.
- Следвайте програма за редуциране на мъжките и преценявайте физическата кондиция за:
 - Крака и ходила
 - Замускуленост
 - Цвят на лицето
 - Състояние на клоаката
- Където е налична светоизолация не надвишавайте 13 до 14 часа светлинен ден (30-60 лукса/3-6 фут кандели).



Бърз растеж на яйцепровод, яйчници и тестиси.

Половата зрялост настъпва 10-14 дни след светостимулацията.