

0-27 dnů | 0-4 týdny

- Dosáhněte cílové hmotnosti a uniformity.
- Podporujte chuť k žrádлу správnou technikou po zástavu 1 d. kuřat.
- Zajistěte správný krmný a napájecí prostor.
- Sledujte naplněnost volátka.
- Sledujte chování kuřat.
- Udržujte optimální teplotu, vlhkost a ventilaci.
- Važte kuřata každý týden, od 14 dnů individuálně, aby bylo možné spočítat KV%.
- Pokud jsou haly zatemněné, snižte intenzitu světla na 10-20 luxů po desátém dnu stáří.

28-63 dnů | 4-9 týdnů

- Dosáhněte cílové hmotnosti a uniformity.
- Proveďte třídění ve 28 dnech.
- Roztřídte hejno na 2 (KV% pod 12) nebo na 3 populace (KV% větší než 12).
- V každé roztříděné populaci kontrolujte růst a krmení tak, abyste dosáhli stanovené hmotnosti do 63 dnů.
- Přestaňte přemísťovat drůbež mezi populacemi od 63 dne.
- V 63 dnech porovnejte skutečnou hmotnost s cílovou a pokud je potřeba nastavte novou cílovou hmotnost.

64-105 dnů | 9-15 týdnů

- Upravte krmnou dávku tak, abyste dosáhli cílovou hmotnost a vyrovnanost:
 - Kusy, které jsou pod křivkou by měly růst podle profilu, který je přivede na cílovou hmotnost do 105 dnů.
 - Kusy, které jsou nad váhou by měly růst podle profilu rovnoběžného se standardní křivkou.
- Drůbež by v tomto období nikdy neměla ztrácet hmotnost.

106-161 dnů | 15-23 týdnů

- Zvyšujte krmnou dávku ke stimulaci růstu podle růstové křivky a připravujte hejno na pohlavní dospělost.
- Kontrolujte otevírání stydkých kostí týdně pro monitorování dosažení dospělosti.
- Vyhodnoťte uniformitu hejna týden před plánovanou stimulací prodloužením světelného dne:
 - Pokud má hejno stanovenou hmotnost a je vyrovnané (KV% < 10) přidejte světlo podle doporučení.
 - Pokud hejno nedosáhlo stanovenou hmotnost a nebo je nevyrovnané (KV% > 10), stimulujte hejno světlem nejméně o 7 dnů později.
- Připávejte kohouty ve 147 dnech, zajistěte aby slepice i kohouti byli stejně pohlavně vyspělí.
- Pravidelně pozorujte hejno při krmení pro posouzení účinnosti odděleného krmení kohoutů a distribuce krmiva.

162-210 dnů | 23-30 týdnů

- Stimulujte a podporujte slepice krmivem ke zvýšení snášky, vyšší hmotnosti vajec a růstu.
- Začněte krmit směs NP nejpozději v 5 % snášky.
- Krmte kohouty tak, abyste podpořili růst a oplozenost.
- Snižujte stav kohoutů podle programu a posuzujte kondici kohoutů podle:
 - Stavů běháků
 - Osvalení
 - Vybarvení tváří
 - Stavů kloaky
- Pokud je hala zatemněná, nepřekračujte 13 – 14 hodin světla (kolem 60 luxů).


Tělesná hmotnost



Rychlý růst kostry, imunitního, cévního a trávicího systému & opeření.



Období pokračování růstu a vývoje.



90% růstu kostry je ukončeno do cca 80-95 dnů stáří.



Zrychlující se růst & větší přírůstky jsou přípravou k pohlavní dospělosti a k připáření.



Rychlý růst vaječníků a varlat

Pohlavní dospělosti se dosahuje 10-14 dnů po stimulaci světlem.