

SAÚDE INTESTINAL NA GRANJA



FASE INICIAL

A fase inicial é o melhor momento para promover o desenvolvimento intestinal, e isso é alcançado por meio da oferta do seguinte:

Boa biossegurança	Condições corretas de aquecimento
Qualidade e composição corretas dos alimentos	qualidade e tratamento da água

FATORES QUE AFETAM A SAÚDE INTESTINAL

Ventilação e temperatura	Desenvolvimento intestinal - Durante a incubação - Durante o manejo inicial
Qualidade das camas de aviário	Infecção
Qualidade da água	Medicamentos
Alimentos - Micotoxinas - Forma física do alimento - Ingredientes do alimento	Biossegurança
	Estresse

Esôfago

Mudanças repentinas no alimento e no consumo de água podem indicar uma mudança na saúde intestinal.

Proventrículo

Cólon

Papo

Fígado

Moela

DUODENO

ÍLEO

JEJUNO

RETO E CLOACA

CLOACA

Cecos

Intestino delgado



Série Focus da Aviagen: Saúde intestinal sem antibióticos



Guia sobre a saúde intestinal na granja

Inspecione o excremento diariamente.



O excremento é um dos melhores indicadores da saúde intestinal.



Anormalidades comuns



Excremento úmido



Excremento pálido



Passagem de ração



Conteúdo cecal gasoso

PRODUTOS PARA A SAÚDE INTESTINAL

- ✓ Probióticos
- ✓ Prebióticos
- ✓ Pós-bióticos
- ✓ Ácidos orgânicos
- ✓ Óleos essenciais

ESTIMULAÇÃO DA MOELA


A estimulação da moela é importante para o ótimo funcionamento do intestino e a eficiência biológica.




DESENVOLVIMENTO DE VILOSIDADES

As células de divisão rápida alongam as vilosidades devido a vários pontos de crescimento de vilosidades.


Após a fase inicial, as vilosidades apenas crescerão na base. Portanto, a velocidade de crescimento das vilosidades diminuirá.



Na incubação



Primeiros 4/10 dias



Célula madura final

CAUSAS DE UMA CLOACA EMPLASTADA

- ✓ Desidratação
- ✓ Estresse por calor
- ✓ Estresse por frio
- ✓ Alimentação incorreta
- ✓ Qualidade precária da água
- ✓ Parasitas intestinais