

# MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN DE REPRODUCTORAS DE POLLOS DE ENGORDE

## Puntos clave para el manejo exitoso de la alimentación de reproductoras de pollos de engorde



### SISTEMAS DE COMEDEROS

#### ESPACIO EN EL COMEDERO POR AVE

| Edad de las hembras (días) | Comedero de línea cm (pulgadas) | Comedero de plato cm (pulgadas) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0-35                       | 5 (2)                           | 4 (2)                           |
| 36-70                      | 10 (4)                          | 8 (3)                           |
| 71-retiro                  | 15 (6)                          | 10 (4)                          |

#### ALIMENTO TIEMPO DE DISTRIBUCIÓN



**i** La altura del comedero debe promover tiempos de consumo de alimento uniformes en toda la población.



**Correcta**  
altura del comedero de línea



**Correcta**  
altura del comedero de plato

### MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DE ALIMENTACIÓN

**i** Deje aproximadamente 1 m (3.3 ft) entre las líneas de comederos. Distribuya la primera ronda de alimentos cuando esté oscuro.



**Correcta**



**Incorrecta**

Tiempo de consumo del alimento en la producción máxima (horas)

3-4

2-3

1-2

Textura del alimento

HARINA GRUESA

MIGAJAS

PÉLET

Muchos factores afectan el tiempo de consumo del alimento, entre ellos:

**Edad.**

**Temperatura ambiente.**

**Volumen del alimento.**

**Calidad física del alimento.**

**Densidad nutricional del alimento.**

### ALIMENTACIÓN POR SEXOS SEPARADOS



**Comederos de plato automáticos**



**Tolvas colgantes.**



**Línea suspendida de comederos.**

Monitoree estas conductas de alimentación en los machos:

**Comen en la ubicación de alimentación correcta.**

**Derraman alimento.**

**Falta la restricción para machos.**

La altura del comedero para machos es correcta.

### MONITOREO DE LLENADO DE BUCHE

Evalúe la distribución del alimento monitoreando el llenado de buche para prevenir la pérdida de la uniformidad:

Observe el comportamiento de las aves 30 minutos después de la primera ronda de alimento.




**Correcta**

**Incorrecta**

### MANEJO DE TOLVAS

Cómo garantizar que la última ronda de alimentos haya circulado correctamente



**Correcta**

**OK:** Complete la última ronda de alimentación. **Mismo nivel de alimento restante todos los días.**

### CONOZCA MÁS



Indicaciones sobre las reproductoras de pollos de engorde 1: Cómo evaluar el llenado de buche (Aviagen)



Indicaciones sobre las reproductoras de pollos de engorde 7: Medición de la velocidad de los comederos de cadena (Aviagen)

