

การจัดการการให้อาหารในไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

กุญแจสำคัญของการจัดการการให้อาหารในไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อให้ประสบความสำเร็จ

Aviagen®

ระบบการให้อาหาร

พื้นที่การกินต่อตัว			ระยะเวลา กระจายอาหาร <3 นาที
อายุไก่เพศเมีย (วัน)	รางอาหาร ชม. (นิ้ว)	แพนอาหาร ชม. (นิ้ว)	
0-35	5 (2)	4 (2)	
36-70	10 (4)	8 (3)	
71-ปลด	15 (6)	10 (4)	

❗ ความสูงของอุปกรณ์ให้อาหาร ควรช่วยส่งเสริมให้ระยะเวลาการกินอาหารมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งฝูง



ติดตามพฤติกรรมกรรมการกินอาหาร

❗ มีพื้นที่ระหว่างไลน์อาหารประมาณ 1 เมตร (3.3 ฟุต) ปิดไฟเดินอาหารรอบแรก



ระยะเวลา การกินอาหาร ในช่วงให้ผลผลิตสูงสุด (ชั่วโมง)	ชนิด อาหาร	มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ ระยะเวลาการกินอาหาร เช่น อายุ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ปริมาณอาหาร ลักษณะทางกายภาพของอาหาร ความหนาแน่นของสารอาหาร
3-4	ผงหยาบ	
2-3	เม็ดปี้	
1-2	อัดเม็ด	

การให้อาหารแบบแยกเพศ



แพนอาหารแบบอัตโนมัติ

ถังอาหารแบบแขวน



รางอาหารแบบแขวน

สังเกตพฤติกรรมกรรมการกินอาหารของไก่เพศผู้:

ไก่เพศผู้เข้ากินอาหารในบริเวณที่กำหนดไว้

อาหารหกหล่น

ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไก่เพศผู้เข้าถึงอาหารไก่เพศเมีย

ความสูงของอุปกรณ์อาหารไก่เพศผู้ถูกต้อง

ติดตามขนาดกระเพาะพัก


ประเมินการกระจายอาหารโดยการดูขนาดกระเพาะพักเพื่อป้องกันการสูญเสียความสม่ำเสมอของฝูง

สังเกตพฤติกรรมไก่หลังจากเดินอาหารรอบแรกไปแล้ว 30 นาที



การจัดการถังอาหาร

วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่า
การกระจายอาหารรอบสุดท้ายนั้นถูกต้อง



ข้อมูลเพิ่มเติม



Broiler Breeder
How to 1:
การประเมินกระเพาะพัก
(Aviagen)



Broiler Breeder
How to 7:
การวัดความเร็ว
ของโซ่รางอาหาร
(Aviagen)

